

Els pacients VIH presenten malalties comunes

- EL VIH s'ha convertit en una malaltia crònica amb una esperança de vida propera a la de la població general
- Els pacients VIH desenvolupen les mateixes malalties que la població general (hipertensió, diabetis, hipercolesterolemia, etc..), però en una proporció superior.
- Els pacients desitgen una atenció global centrada en la seva persona

Els especialistes en malalties infeccioses han de fer de metge de família o el metge de família ha d'oferir una atenció global al pacient HIV?

Que desitgen els pacients?

- Els pacients desitgen que la Unitat de VIH atengui els seus problemes comuns, que faci de metge de família.

Who Provides Primary Care? An Assessment of HIV Patient and Provider Practices and Preferences. J AIDS Clin Res. 2014 November ; 5(11):

Que opinen els especialistes en malalties infeccioses?

- Los facultativos perciben dificultades en el seguimiento del VIH en AP, incluso para usuarios con buen control del VIH. Enfermeras y auxiliares de enfermería se muestran más abiertos a esta posibilidad por la cercanía domiciliaria y la promoción de la salud de AP.

Incremento de la participación de Atención Primaria en la asistencia al virus de la inmunodeficiencia humana: opinan los profesionales de las unidades hospitalarias Aten Primaria. 2014;**46(4)**:204-213

- Els especialistes en malalties infeccioses es senten incomodes fent de metge de família

Who Provides Primary Care? An Assessment of HIV Patient and Provider Practices and Preferences. J AIDS Clin Res. 2014 November ; 5(11):

Que opinen els metges de família?

- La SEMFYC esta a favor del seguiment del pacient VIH en atenció primària

La infección por el VIH/sida y atención primaria. Aten Primaria 2004;33(1):3-5

- L'experiència australiana de descentralitzar l'atenció dels pacients VIH als metges de família va ser exitosa, enriquidora pels metges i molt satisfactoria pels pacients que rebien una atenció global i més propera

At the coalface and the cutting edge: general practitioners' accounts of the rewards of engaging with HIV medicine. BMC Family Practice 2013, 14:39



Task shifting from doctors to non-doctors for initiation and maintenance of antiretroviral therapy

- Our review found moderate quality evidence that shifting responsibility from doctors to adequately trained and supported nurses or community health workers for managing HIV patients probably does not decrease the quality of care and, in the case of nurse initiated care, may decrease the numbers of patients lost to follow-up

Kredo T, Adeniyi FB, Bateganya M, Pienaar ED. Task shifting from doctors to non-doctors for initiation and maintenance of antiretroviral therapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD007331. DOI: 10.1002/14651858.CD007331.pub3.

**WE GET TO KEEP
MORE OF OUR
RESOURCES**

