



Cures del peu diabètic
Abordatge integral: Protocol del peu DM, full de registre
i seguiment específic
Carmen Herranz

IX JORNADA D'ATENCIÓ COMPARTIDA EN CIRURGIA VASCULAR DE L' AIS-BE
Sala Polivalent, Vil·la Florida, C/ Muntaner, 544
24 febrer 2017

VALORACIÓ ANUAL DELS PEUS

Exploració:

- ANAMMESI
- OBSERVACIÓ
- PÈRDUA DE SENSIBILITAT PROTECTORA
- MALALTIA VASCULAR PERIFÈRICA





ANAMNESI. FACTORS PREDICTIUS D'ULCERES



OBSERVACIÓ
Dèrmica i ungueal
Morfològica i articular
Autocura



PÈRDUA DE SENSIBILITAT PROTECTORA (PSP)

1. Monofilament de Semmes-Weinstein MSW (Sensibilitat barestèsica o pressora)



PÈRDUA DE SENSIBILITAT PROTECTORA (PSP)

2. Diapasó Graduat de Rydel-Seiffer (Sensibilitat pal·lestèsica o vibratòria)



- PÈRDUA DE SENSIBILITAT PROTECTORA (PSP)**
- 3. Neurotensiòmetre de Horwell (Sensibilitat pal·lestèsica o vibratòria)**
 - 4. Sensibilitat tèrmica**



MALALTIA VASCULAR PERIFÈRICA (MVP)

- Presa de polsos en Pèdia i Tibial Posterior
- Índex Doppler Turmell-Braç ITB

CLASSIFICACIÓ DE RISC

1. Peus de baix risc. RISC 1

NO PSP, NO MVP

No deformitats estructurals peu

2. Peus de mig risc. RISC 2

NO PSP, NO MVP

deformitats estructurals peu. FRCV

3. Peus d'alt risc. RISC 3

PSP, o MVP sense lesions. Escala de Wagner 0

4. Peu diabètic

PSP i/o MVP amb lesió.

Wagner 1-5.





Gràcies

Carmen Herranz
cherranz@clinic.cat