

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

6 de maig de 2009

Sala d'actes del Departament de Salut (Roc Boronat, 81-95. 08005 Barcelona)



Organitzat pel Grup de recerca sobre utilització d'antipsicòtics en el marc de l' AIS Barcelona Esquerra

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## CASO CLINICO XHR

48 años, sexo masculino, soltero, hijo único, vive con su madre quien padece de E Alzheimer.

ESCOLARIDAD: COU, Alemán (dos títulos en el Inst. Goethe), Técnico auxiliar de farmacia.

SITUACIÓN SOCIAL: Incapacidad Permanente Absoluta.

ENFERMEDAD ACTUAL: Inicio de Enfermedad Actual en 1987 (a los 18 años), con síntomas afectivos, motivacionales y del comportamiento que son tratados inicialmente como un Trastorno Depresivo. Adicionalmente presenta pérdida del vínculo socio afectivo, pérdida de la productividad , en 1990 inicio de Sintomatología psicótica positiva con alteraciones del pensamiento, sensopercepción, con Diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide.

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

### (Primera Etapa)

1987-90 Desvinculado- terapias Alternativas

1991 **Perfenazina 8 mg/día, Levomepromazina 100 mg día (En combinació)**, Imipramina 75 mg día,, Acido Valproico, Maprotilina.

1992 **Pimozide, Pipotiazina 100 mg cada 3 semanas (en combinació)**, Mutabase 4/10, Maprotilina 75 mg/día, levomepromazina 25 mg/día, Trimipramina, Manerix 150 mg/día, Paroxetina 20 mg día (en diferentes combinaciones)

1993 **Pipotiazina, Sulpiride 300 mg/día, (En combinació)**, Mutabase 4/10, Paroxetina hasta 60 mg/día, Clorazepato.

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

1994. Pipotiazina 100 mg cada tres semanas, se retira y posteriormente inician: Risperidona 4 mg /día, Litio 1000 mg/día, Ciclopentixol, Diazepam 20 mg/día.

1997-99. **Ciclopentixol, Olanzapina 5 mg/día (en combinación),**

Pruebas terapéuticas con diferentes antidepresivos: Maprotilina 75 mg /día, Mirtazapina 30 mg día, Citalopram 20 mg/día,, Diazepam 10 mg (0-0-1), Zolpidem 10 mg /día,.

2000-01 **Quetiapina 100 mg/día, Olanzapina 5 (En Combinación),** Etumina, Midazolam,

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

2004 Venlafaxina 75 mg, Olanzapina 10 mg

2003-05 Olanzapina 10 mg, Reboxetina 4 mg,  
Carbamazepina 400 mg, etumina.

2005-07 Maprotilina 75 mg (0-0-1), Ciclopentixol  
gotas (0-15-15), Olanzapina 10 mg (0-0-1) ,  
Clorazepato 25 (0-0-1), Diazepam 10 (0-0-1).

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Tratamiento Farmacológico Actual Nueva Etapa

### Inicia tratamiento en CSMA de les Corts en marzo de 2007

Marzo/2007

- |                            |               |                     |
|----------------------------|---------------|---------------------|
| - Clorazepato 10 mg        | (0.5- 0.5- 0) |                     |
| - Venlafaxina Retard 75 mg | (1-0-0)       |                     |
| - Olanzapina 10 mg         | (0-0-1)       |                     |
| - Quetiapina 100 mg        | (0-0-1)       | <b>No lo toleró</b> |

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Tratamiento Actual (I)

**Desde Julio - Diciembre de 2007:**

Amisulpride 100mg	0-0-1
Olanzapina 10mg	0-0-1
Venlafaxina retard 75 mg	1-0-0
Topiramato 100 mg	0-0-1 (abuso de OH) de julio a septiembre/07
Loprazolam 1 mg	0-0-1 (si precisa)

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Tratamiento Actual (II)

En Enero de 2008, Optimización de dosis de fármacos:

- Venlafaxina Retard 150 mg (0-0-1) aumento
- **Amisulpride 100 mg (1-0-1) aumento**
- **Olanzapina 10 mg (0-0-1)**
- Loprazolam 1 mg (0-0-1) Si precisa.

En Marzo de 2008 (8 semanas después) Ausencia hasta la fecha de Sintomatología Positiva.

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Tratamiento Actual (III)

En febrero de 2009:

- **Amisulpride** 100 mg (0-0-1)
- **Olanzapina** 10 mg (0-0-1)
- **Venlafaxina Retard** 150 mg (1-0-0)
- **Levomepromazina gotas** (0-0-3)
- **Loprazolam** 1 mg (intentar retirada)

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Evolució Clínica

Por datos de HC y del Paciente: Inicio de síntomas a los 18 años (periodo prodrómico). Desde 1987 hasta 1990.

Inicio de Sintomatología Positiva en 1990 con Alteraciones en contenido del Pensamiento: Ideación de Perjuicio, Persecutoria, de Tipo Místico, Experiencias de Pasividad “en la Televisión Hablaban para Mí y los demás sabían lo que yo pensaba”, fenómeno de lectura del pensamiento.

Alteraciones Sensoperceptivas con alucinaciones auditivas complejas.

Comienza Tratamiento En CSMA de Les Corts en Marzo 2007, con evidencia de alteraciones ideativas y alteraciones sensoperceptivas con ilusiones visuales.

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Evolución Clínica (II)

Persistencia de Sintomatología positiva hasta Marzo de 2008.  
Inicia En Servicio de Rehabilitación en Septiembre de 2008, con mejoría progresiva en Vínculo socio-afectivo, Introspección, Prospección, Ausencia de Síntomas de esfera del pensamiento o Sensopercepción.

Persistencia de Elementos Motivacionales y trastorno del Ritmo Circadiano.

El paciente evalúa su mejoría en el último año como algo asociado a una Mejoría en su vínculo social, inicio en el CD.  
Puede hablar de un **antes** y un **Después** en la Historia Natural.

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Evaluación cognitiva (23-02-2009)

### WAIS III

**CIV 116 Media o superior a la media**

**CIM 96 Media**

Conserva adecuadamente capacidad Atencional, concentración, planificación, MCP y procesos de ejecución y visualización. Debilidad en subtest de Semejanzas y Aritmética, con Posible rigidez en procesos de pensamiento o pensamiento concreto.

**RAVLT Superior a la Media en cada ensayo**

**TMT A 60 Media Atención conservada**

**TMT B 40 Medio-Bajo Planeación y secuenciación**

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## **Discusión (I):**

Dos niveles de discusión:

### **-Evolución Clínica.**

Evolución con sintomatología psicótica persistente (Sx positivos y negativos) y Clínica afectiva. (F20.0- F32.9)

Persistencia de síntomas positivos desde el inicio de la enfermedad hasta Marzo de 2008.

**Preguntas:** Esquizofrenia resistente???  
Trastorno afectivo asociado Vs Sx negativos???

**Intervención:** Trabajo interdisciplinario??  
Redes de apoyo??

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## PANSS

	PUNTUACIÓ	PERCENTIL
PANSS-P	9 (Excitació)	5
PANSS-N	7	5
PANSS-G	32	25

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Discusión (II)

### - Farmacológico:

#### Primera etapa:

- Dosis sub-terapéuticas de antipsicóticos y antidepresivos.
- Uso crónico de Benzodiazepinas
- Combinaciones no Justificadas o con alto riesgo de efectos adversos.
- Evidencia Débil de la posible Utilidad de combinaciones realizadas.

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Perfil Receptorial de Amisulpride Vs Olanzapina

	D1	D2	5HT1A	5HT2A
AMISULPRIDE	+	+++ (D2/D3)	--	+
OLANZAPINA	+	+	--	++